Geriatrische Betreuung in der Grundversorgung Demenz, Fahreignung, Urteilsfähigkeit, Psychopharmaka...

Irene Bopp-Kistler, Dr. med,
FMH Innere Medizin, spez Geriatrie
Medix Gruppenpraxis

Leitende Ärztin Stadspital Zürich
Memory Clinic

Fortbildung
Institut für Hausarztmedizin – MediX
10.3.2022

Abendstimmung aus dem Praxiszimmer Rotbuchstrasse 46

Die Grundversorgung als Pfeiler einer evidenzbasierten, sinnvollen Medizin: die Geriatrie kann da unterstützen.

Medix Rotbuchstrasse

Die Medizin ist angetreten, um das Schicksal zu bekämpfen. Aber gerade dieser erreichte Erfolg droht heute der Medizin zum Verhängnis zu werden, weil die Medizin in ihrer auf Machbarkeit orientierten Grundhaltung dem Irrglauben verfallen ist, dass sie überhaupt kein Schicksal mehr zu akzeptieren brauche...
(Giovanni Maio)

Das Denken bestimmt, wo stehen Demenz Erkrankte?

«Die Erkrankung betrifft genau den Bereich, der uns so wichtig ist: unser Denken und unsere Persönlichkeit, weswegen sich die Frage stellt, ob ein solches Leben noch Sinn macht».

Aus demenz. Fakten Geschichten Perspektiven
Irene Bopp-Kistler

Der Beginn der Demenz- Minor Neurocognitive Disorder

Früher MCI: schwierige Prognose

- Wieso versage ich im Beruf?
- Wie sieht meine/unsere Zukunft aus?
- Wieso habe ich mehr Konflikte?
- Wieso sprechen alle über mich
- Mobbing? Depression?
- Verunsicherung
- Krisensituation
- Wieso versteht mich meine Mutter nicht mehr?

Wann und welche Abklärung bei Verdacht auf Demenz

Red flags...(adaptiert nach Swiss Memory Clinics 2018)

- Wenn sich Patienten Sorgen machen (nicht einfach vertrösten, ernst nehmen)
- Burnout, Probleme am Arbeitsplatz!
- Hinweise durch Dritte (Angehörige, Spitex u.a.)
- Auffälligkeiten in der Praxis (Termine, Medikamentenmanagement, Mahnungen, Hygiene, Diabetesmanagement u.a.)
- Veränderung des Verhaltens!
- Alert sein bei St. nach Delir!

Verlauf vor der Demenzdiagnose

- **Subjective Cognitive Decline**
(kann, muss aber nicht Risiko sein für Demenz!)
- **Minor Neurocognitive Disorder**
(leichte Defizite ohne wesentliche Probleme im Alltag)
- **Verhaltensveränderung, psychische Veränderung**
- Probleme in den AADL
(Advanced Activities of Daily Living):
Beruf, Gesellschaft
- Erst danach Probleme in den IADL
(instrumentierte Fähigkeiten des Alltags!)

Wer soll abgeklärt werden: Case finding anstelle von generellem Screening!

Die Empfehlungen der Swiss Memory Clinics für die Diagnostik der Demenzerkrankungen

Recommendations of Swiss Memory Clinics for the
Diagnosis of Dementia

Markus Bürge^{1,2,6}, Gabriela Bieri^{1,2,7}, Matthias Brühlmeier⁸, Françoise Colombo^{1,5,9},
Jean-Francois Demonet^{1,3,10}, Ansgar Felbecker^{1,3,11}, Dan Georgescu^{1,4,12}, Anton Gietl^{13,14},
Andrea Brioschi Guevara^{1,5,10}, Freimut Jüngling¹⁵, Eberhard Kirsch¹⁶, Reto W. Kressig^{1,2,17},
Luka Kulic¹³, Andreas U. Monsch^{1,5,17}, Martin Ott^{7,18}, Hans Pihan^{1,3,19}, Julius Popp^{20,21},
Luca Rampa²², Brigitte Rügger-Frey²³, Marianne Schneitter²⁴, Paul Gerson Unschuld^{4,13},
Armin von Gunten^{1,4,20}, Birte Weinheimer¹⁸, Roland Wiest²⁵ und Egemen Savaskan^{1,4,13}

Praxis 2018; 107 (8): 435-451

Doch was machen wir bei der Fahreignung?

Welche Abklärungen sind indiziert?

- Anamnese und Fremdanamnese!
Verlauf, Fragen nach Alltag, Fragen nach Verhaltensänderungen
- Labor, körperliche Untersuchung
(insbesondere neurologisch)
- Screeningtest
- Danach "Shared Decision Making":
 - Bildgebung
 - Überweisung in eine Memory Clinic

Mögliche Zeichen im Alltag bei Alzheimerdemenz

Instrumental Activity of daily living (IADL): zuvor aber AADL beeinträchtigt (Advanced Activity)

- Finanzen
- Einkaufen
- Kochen
- Wahrnehmung des Tagesgeschehens
- Lesen, Verstehen
- Termine
- Medikamenteneinnahme
- Benützung ÖV, Autofahren

Standardisierter Fragebogen: Fremdanamnese Angehörige: IQCODE (gekürzte Version: Ehrensperger et al: Int Psychogeriatric 2009, aufgenommen in den Medix Richtlinien)

	viel besser	ein bisschen besser	unverändert	ein bisschen schlechter	viel schlechter
1. Sich an Dinge erinnern, die Familienmitglieder und Freunde betreffen (z.B. Geburtstage, Adressen, Berufe).	☐				
2. Sich an vor kurzem stattgefundene Ereignisse erinnern.	☐				
3. Sich an vor einigen Tagen stattgefundene Unterhaltungen erinnern.	☐				
4. Wissen, welcher Tag und Monat es ist.	☐				
5. Sachen wiederfinden, die an einem anderen Ort als üblich aufbewahrt werden.	☐				
6. Neue Dinge im Allgemeinen zu lernen.	☐				
7. Finanzielle Dinge zu regeln wissen (Rente, Überweisungen, Bankgeschäfte usw.).	☐				

Neurokognitive Störungen im DSM-5

Durchgreifende Änderungen
in der Demenzdiagnostik

Was belastet?

- Unruhe
- Aggressivität
- Verweigerung
- Halluzinationen
- Wahnhaftige Züge
- Antriebslosigkeit
- Ängstlichkeit
- Tag – Nachtrhythmus
- Umherwandern....

Menschen mit Demenz sind das Spiegelbild des Umfelds...

Einmal nach nirgendwo: die Anamnese...

Wie geht es den Angehörigen, was belastet?

Aus dem Buch demenz. Fakten Geschichten Perspektiven

»Einmal nach nirgendwo«, so die Aussage eines demenzerkrankten Patienten.

Darauf reagierte die Ehefrau mit den Worten, dass sie in der genau gleichen Situation sei, es sei wie ein Aufbrechen nach nirgendwo, irgendwohin.

Eine andere Partnerin meinte, dass es wie ein Albtraum sei, der nicht mehr aufhöre: »Ich bin Witwe, obwohl mein Mann noch lebt.«

Was macht weh? Kommunikation!

- Fehlende Vertrautheit, Entfremdung
- Auslösung von Scham, Abscheu
- Kindlichkeit
- Gleichgültigkeit
- Antriebslosigkeit
- Sexualität
- Nicht verstanden sein

Screening-Tests: nicht nur quantitativ, auch qualitativ auswerten, auch Beobachtung während des Tests...

Pädiatriezimmer Medix, beliebt bei geriatrischen Patienten

- Erklärungsmodelle
- Verhalten während der Abklärung
- Validation von Seiten der Professionellen
- Aus meiner Sicht möglichst nicht delegieren
- Setting muss stimmen
- Erklärung der Testsituation

Der Minimalstatus: der Oldie...

J. psychiat. Res., 1975, Vol. 12, pp. 189-198. Pergamon Press. Printed in Great Britain.

“MINI-MENTAL STATE”

A PRACTICAL METHOD FOR GRADING THE COGNITIVE
STATE OF PATIENTS FOR THE CLINICIAN*

MARSHAL F. FOLSTEIN, SUSAN E. FOLSTEIN

and

PAUL R. MCHUGH

Department of Psychiatry, The New York Hospital-Cornell Medical Center,
Westchester Division, White Plains, New York 10605, U.S.A.

and

Department of Psychiatry, University of Oregon Medical School, Portland, Oregon 97201, U.S.A.

(Received 17 December 1973; in revised form 25 November 1974)

MMS(E)

- Seit 1975 eingesetzt
- Verschiedene Versionen
 - Trennschärfe bei Cut-off 27/30: Sensitivität 77%, Spezifität 75%
 - Kombination mit Uhrentest Sensitivität 81%, Spezifität 90%

Vorteile	Nachteile
Wenig aufwendig	Nicht für frühe Stadien
Vergleichbarkeit	Untersucherabhängig
Kostengünstig	Prüft kaum Exekutivfunktionen oder semantisches Gedächtnis
	Lerneffekt
	Berücksichtigt weder Alter, Geschlecht noch Ausbildungsniveau

Uhrentest: der geniale einfache Test

Bild: Internet

UHRENTEST

KG 2.1/31b

Thalman Beat et al., Basel. Geriatrie Praxis 2/1997, 31.

Ohne Vorlage

Bitte zeichnen Sie eine Uhr!
Mit allen Zahlen und Zeigern

Bezeichnen Sie die Zeit auf Ihrer Uhr so, wie sie z.B. in einem Fahrplan stünde:

Visuokonstruktion
Planung

UHRENTEST

KG 2.1/31b

Thalmann Beat et al., Basel. Geriatrie Praxis 2/1997, 31.

Bitte zeichnen Sie eine Uhr!
Mit allen Zahlen und Zeigern

Mit Vorlage

Bezeichnen Sie die Zeit auf Ihrer Uhr so, wie sie z.B. in einem Fahrplan stünde:

undici e venti

Der TMT B:

- Dysexekutive Störungen
- Visuokonstruktive Fähigkeiten
- Geteilte Aufmerksamkeit

Ein einfacher guter Test:

"kann sich der Patient verfahren?"

In den Medixrichtlinien abrufbar, aus dem CERAD

Wann soll ein MRI oder ein CT durchgeführt werden: Möglichst einmal im Laufe der Demenzerkrankung, es gibt Ausnahmen

Unbedingt erforderlich (Richtlinien Medix, adaptiert Swiss Memory Clinics)

- Atypischer oder unklarer Verlauf
- rasche Symptomentwicklung (innerhalb eines Jahre)
- Jüngere Patienten (< 65 Jahre, evtl. auch älter?)
- Sturzereignisse in der Anamnese, St. nach Schädelhirntrauma
- Ungeklärte neurologische Symptomatik (z. B. Krampfanfälle, Inkontinenz, Gangstörungen, fokale Symptomatik...)
- Karzinom in der Anamnese (in Absprache)
- Antikoagulanteneinnahme oder Blutgerinnungsstörung
- Wenn sich Symptome unter Aspirin oder OAK rasch verschlechtern (Frage nach Amyloidangiopathie! dann immer MRI!)
- Bei polymorbiden betagten Patienten zum Ausschluss einer Blutung genügt ein CT

Schweregrad der Demenz: Abhängig von Alltagsfunktionen, nicht MMS oder MoCA!

- Leicht: instrumentierte Fähigkeiten des Alltags: Haushalt, Umgang mit Finanzen, Einnahme von Medikamenten
- Mittelschwer: Basale Aktivitäten des Alltags: Nahrungsaufnahme, Ankleiden u.a.
- Schwer: vollständig abhängig.

Diagnosestellung: Zusammenfassung

- Alltagsstörung (Anamnese, Anamnese..... Anamnese..... Alltag, Verhalten, Verlauf u.a.)
- Testung:
Psychometrie
evtl. neuropsychologisch
- Klinische Untersuchung
- Labor
- Bildgebung
- Evtl. PET
- Evtl. Marker im Liquor

Die Diagnoseübermittlung: Wie ein Filmriss...

- Da verarmen wir: wie sollen wir das finanziell schaffen?
- Ich habe so Angst, dass mich meine Frau nicht mehr erkennt...
- Qualität der Diagnoseübermittlung
- Recht auf Information!
- Beginn von Advance Care Planning

Das Diagnosegespräch: am Anfang steht die Kommunikation Betroffene und Angehörige haben das Recht auf Information!

- Das Diagnoseeröffnungsgespräch ist immer mit Emotionen verbunden und bleibt deswegen im Gedächtnis der Betroffenen stark gespeichert.
- Es stellt sich oft die Frage: wie reagiert mein Umfeld?
Angst auch, nicht mehr autonom zu sein.
- Stigmatisierung?

Eine Hiobsbotschaft?

Angst vor möglicher Suizidalität: deswegen keine Diagnosestellung?
End of life decisions, oft «Exitfrage»...

Man erfindet nicht eine Diagnose, sondern man gibt belastenden Symptomen einen Namen...Der Weg ist lang...

Aussagen von Betroffenen...

- „Können Sie mir helfen, ich bin so stumm...“
- „Ich weiss, was ich sagen möchte, doch ich kann es nicht sagen...“
- Muss ich nun mein Leben lang mit Alzheimer leben?

Wann ist eine Überweisung in eine Memory Clinic sinnvoll?

Nebel am Morgen, Rotbuchstrasse 46

- Junge Patientinnen und Patienten
- Atypische Symptomatik
- Rasche Progredienz
- Unklare Einordnung, seltene Demenzformen
- unklare Diagnostik (z.B. DD Depression)
- Überforderungssituation (Betroffene, Angehörige, Professionelle)
- Bedürfnis der Betroffenen und Angehörigen
- Alternativ z.B. Ältere, die keine so breite Abklärung wünschen: Geriater*in in der Praxis

Was für Therapien gibt es?

- Vertrauen
- Nicht medikamentös vor medikamentös
- Advance Care Planning äusserst wichtig!

Schweizerische Gesellschaft für Alterspsychiatrie & Alterspsychotherapie (SGAP)¹; Schweizerische Neurologische Gesellschaft (SNG)²; Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG)³; Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP)⁴; Swiss Memory Clinics (SMC)⁵; Schweizerische Gesellschaft für Biologische Psychiatrie (SGBP)⁶; Schweizerische Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen (SVNP)⁷; Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK)⁸; Schweizerische Alzheimervereinigung⁹

¹Egemen Savaskan, ¹Irene Bopp-Kistler, ¹Markus Buerge, ²Regina Fischlin, ^{1,4}Dan Georgescu, ¹Umberto Giardini, ⁶Martin Hatzinger, ¹Ulrich Hemmeter, ¹Isabella Justiniano, ³Reto W. Kressig, ¹Andreas Monsch, ¹Urs P. Mosimann, ²Renè Mueri, ⁸Anna Munk, ¹Julius Popp, ⁸Ruth Schmid, ¹Marc A. Wollmer

Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der behavioralen und psychologischen Symptome der Demenz (BPSD)

Therapy Guidelines for the Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia

Praxis 2014

Primär nicht medikamentöse Therapien!!

Verschiedene Sichtweisen...

Anosognosie: mangelnde Krankheitseinsicht

Umgang mit der Anosognosie (mangelnde Krankheitseinsicht): ich brauche doch keine Hilfe...

- Spiegeln...
- Möglichst wenig Argumentation
- Wertschätzung für das Erreichte
- Selbstwert stärken

Kommunikation (Validation)

- Spiegeln der Gefühle
- Versuch, wahrzunehmen, was mir der Demenzerkrankte sagen möchte
- Demenzerkrankte sprechen oft wie in Metaphern
- Menschen mit Demenz möchten verstanden werden!
- Angehörige möchten auch verstanden werden in ihrer Not.

Die Angehörigen im Nebel..

Gratwanderung Arbeit – Betreuung – Finanzierung

- «Es sind nicht Ratschläge, die ich bekomme, sondern Schläge ins Gesicht...»
- Angehörige wollen verstanden werden, nicht nur Entlastung!
- Hochrisikogruppe
- Elderly Abuse

Partnerschaft? Loslassen von der Beziehung?

- Ich bin ein Pflegeheim mit einem Patienten und einer Angestellten, die 24 Stunden arbeitet...
- Ich sehne mich nach einer neuen Partnerschaft, kann aber nicht einmal daran denken....
- Daneben sollte ich noch die sexuellen Bedürfnisse meines Partners stillen...
- Ich kann nicht mehr...
- Ich fühle mich schuldig....

Vom Loslassen der gemeinsamen Vergangenheit

Das Sprechen über Gemeinsames ist zunehmend nicht mehr möglich

In diesem fragmentierten Lebensweg sind die Angehörigen zutiefst verunsichert

Was können wir tun für die Betroffenen?

Selbstwert stärken, nicht mit Defiziten konfrontieren!

- Selbsthilfegruppe
- "Gipfeltreffen", andere Treffs
- Musiktherapie, Tanz, Singen
- Malen, Maltherapie
- Museumsbesuch u.a.
- Freizeitgestaltung
- Vernetzung von Betroffenen
- Wenn es Angehörigen gut geht, geht es auch den Betroffenen gut...

Was können wir tun für die Angehörigen?

- Begleiten auf dem Weg ins Ungewisse
- Finanzielle Situation klären, Unterstützen (Treuhanddienst!)
- Genügend Zeit haben (Entlastung)
- Erlernen der Validation, Kommunikation
- Ganzheitliche Behandlung und Betreuung
- Strukturen schaffen, wo sich Betroffene wohl fühlen, dann geht es den Angehörigen auch gut
- "Normalisieren"

Wann kommt der Zeitpunkt für eine Institutionalisierung?

"Für mich gibt es nur eines: Ich bleibe immer in meiner Wohnung, dieser Wunsch steht über allem!» Der Gedanke, das eigene Heim, das eigene Zuhause verlassen zu müssen, scheint unerträglich. Doch ich frage mich, ob sich Menschen mit Demenz ab einem gewissen Stadium in ihren eigenen vier Wänden wirklich noch zu Hause fühlen."

Demenz. Fakten Geschichten Perspektiven.

Fragen

Pause

Medikamente: sind ein Stock, mehr nicht..

Demenz – Delir – BPSD (behaviorale und psychologische Symptome der Demenz)

- Was behandle ich?
- Primärsymptome
- Sekundärsymptome (BPSD)
- Erkenne ich das Delir (oft gar nicht so einfach!)
- Kann ich das Umfeld anpassen? (z.B. Entlaufen)

Offizielle Kriterien der Demenz (DSM V): Primärsymptome

1. Lernen und Gedächtnis
2. Komplexe Aufmerksamkeit
3. Exekutive Funktionen (Planen, logisches Denken u.a.)
4. Sprache
5. Komplexe motorische Fähigkeit
6. Soziale Kognition

Es braucht immer eine Verschlechterung im Alltag!
Wie Regelung der Finanzen oder **Medikamenteneinnahme**

Acetylcholinesterase-Hemmer und Memantin: Shared decision making:

- Ein Teil der Patienten hat einen erkennbaren Effekt auf Kognition (15%) und Alltagsbewältigung (8%)
- Langzeit-Outcome
Pflegeheimweisung kontroverse Resultat.
- Praktisch alle publizierten Guidelines empfehlen die Therapie mit Antidementiva, sogar bei Progredienz in ein schweres Stadium
- Pro und contra sollte aus meiner Sicht immer diskutiert werden!
- Nutzen-Risiko Abwägung sehr wichtig
- Verhaltensauffälligkeiten mit einbeziehen!
- Studien: primäres Endziel ADAS-cog, Lebensqualität kaum einbezogen
- Aus meiner Sicht palliatives Medikament

Antidementiva bei Verhaltensauffälligkeiten (BPSD): zu wenig bekannt!

(mehrere Studien, zusammengefasst in Praxis 2014, Savaskan et al)

Acetylcholinesterase-Hemmer:

Verbesserung der BPSD:

- Apathie
- Irritabilität
- Depression
- Angespanntheit

Meiste Studien mit Donepezil
Bei leichter bis mittelschwerer
Demenz

Memantin:

Verbesserung der BPSD

- Agitation
- Wahn
- Halluzination
- Aggression

Auch weniger Neuauftreten von
BPSD!
Bei mittelschwerer bis schwerer
Demenz

Treatment options of agitation in dementia:

Current Treatment Options in Neurology 2019, JM Ringman et al

Acetylcholinesterase inhibitors and **memantine** should be initiated to enhance cognition, and if present, management of **insomnia** or **sundowning** with **trazodone** is indicated.

Treatment with low doses of atypical antipsychotics such as **risperidone** or **quetiapine** can be effective after appropriate consideration of and disclosure of potential adverse effects.

REVIEW

Trazodone for Insomnia: A Systematic Review

Innov Clin Neurosci. 2017;14(7–8):24–34

- Uraltetes Medikament (seit 1982)
- SARI (Serotonin Antagonist Reuptake Inhibitor)
- Besonders gut bei Schlafstörung bei Alzheimerdemenz!
- Auch bei anderen Komorbiditäten gut dokumentiert
- In tiefen Dosen (25-100mg) schlafanstossend

- Meine Erfahrung: wenn Retardform (1/3-2/3Tbl 150mg) verabreicht wird, sind die Patienten auch am Morgen noch ruhiger.
Einsatz bei BPSD kontrovers: aus meiner Sicht bei vielen Patienten gute Wirkung

Neuroleptika bei BPSD (Konsensus 2014)

- **Typische Neuroleptika:**
Haldol äusserst zurückhaltend, höchstens bei Übergang zum Delir
Pipamperon: gut wirksam, obwohl kaum Studien
- **Atypische Neuroleptika:**
Metaanalyse: Wirkung für **Risperidon** (einzig offiziell zugelassenes Neuroleptikum bei Demenz in der Schweiz!), **Aripiprazol** (Abilify), **Olanzapin** vs Placebo.
- Gabe primär von Risperidon, alternativ Aripiprazol.
Quetiapin: kaum Evidenz, aber gute klinische Erfahrung (cave: QT-Zeit, aber in palliativer Situation auch abwägen)

Neuroleptika bei Demenz: manchmal nicht zu umgehen: aber typische Neuroleptika haben nicht geringere Mortalität!

Tabelle 5
Dosisempfehlungen der American
Psychiatric Association 2007

Substanz	Einsatz bei Demenz	
	Startdosis	Zieldosis
Risperidon (1. Wahl)	0,25–1	1,5–2
Clozapin	12,5	75–100
Olanzapin (2. Wahl)	1,25–5	10
Quetiapin* (2. Wahl)	12,5–50	200–300
Aripiprazol (2. Wahl)	5	15
Haloperidol (3. Wahl)	0,25–0,5	2

*signifikante Wirksamkeit bei Demenzpatienten nicht nachgewiesen

Quelle: APA Work Group on Alzheimer's Disease and other Dementias.
American Psychiatric Association practice guideline for the treatment
of patients with Alzheimer's disease and other dementias. Second
edition. Am J Psychiatry. 2007 Dec;164(12 Suppl):5–56

- Haldol höchste Mortalität
- Risperidon,
- Olanzapin
- Valproinsäure
- Quetiapin

abnehmende Mortalität

Risk of Mortality Among Individual Antipsychotics in Patients with
Dementia, Am J Psychiatry 2012: Helen C. Kales et al

Meine Favoriten:
Risperidon, Quetiapin
auch Pipamperon

Weitere Psychopharmaka bei Demenz

(nach Praxis 2014 Savaskan et al)

- **Antidepressiva: SSRI:**
häufige Komorbidität Angst, Depression (DD Apathie): wirksam
keine sichere Wirksamkeit bei anderen BPSD (z.B. Agitation)
- **Carbamazepin (Tegretol)**
gute Wirksamkeit, aber zu viele NW
- **Valproat (Depakine)**
keine Wirkung, nur NW
- **Gabapentin (Neurontin):**
kaum Studien, aber Wirksamkeit bei Agitation, Aggression, Angst,
Schlafstörung
- **Lamotrigin (Lamictal)**
Kaum Studien, aber wirksam bei Agitation, Aggression, Enthemmung,
Depression

Und wie wäre es mit Ginkgo?

* International Psychogeriatrics 2017,
E. Savaskan et al

- Wirkt bei BPSD...
Angst, Reizbarkeit, Apathie und Depression*
- Gute Alternative zu Antidementiva bei Unverträglichkeit
- Genügend hoch dosiert (240mg) und genügend lang (mind 24 Wochen)
- Auch in deutschen S3-Richtlinien
- Vorsicht bei antikoagulierten Patienten

Und wie wäre es mit Ginkgo?

Received: 23 October 2018

Revised: 27 November 2018

Accepted: 28 November 2018

DOI: 10.1111/cns.13095

CLINICAL GUIDELINES

WILEY **CNS** Neuroscience & Therapeutics

Treatment of dementia and mild cognitive impairment with or without cerebrovascular disease: Expert consensus on the use of *Ginkgo biloba* extract, EGb 761[®]

Nagaendran Kandiah¹ | Paulus Anam Ong² | Turana Yuda³ | Li-Ling Ng⁴ |
Kaysar Mamun⁵ | Reshma Aziz Merchant⁶ | Christopher Chen⁷ | Jacqueline Dominguez⁸ |
Simeon Marasigan⁹ | Encarnita Ampil⁹ | Van Thong Nguyen¹⁰ | Suraya Yusoff¹¹ |
Yee Fai Chan¹² | Fee Mann Yong¹³ | Orapitchaya Krairit¹⁴ | Chuthamane Suthisisang¹⁵ |
Vorapun Senanarong¹⁶ | Yong Ji¹⁷ | Ramesh Thukral¹⁸ | Ralf Ihl¹⁹

Behandlung Delir

D
Drugs

Delir ABC
Universitärer
Geriatricverbund
Zürich

Medikament	Übliche Erstdosierung / 24 h	Eigenschaften
Quetiapin® 5 mg Kps. oder Sequase® (Quetiapin) 25 mg Tbl.	Bis 4 x 5 mg 6.25 – 12.5 – 25 mg max. 50 mg	1. Wahl Atypisches Neuroleptikum, leicht sedierend, gut verträglich bei Parkinson/Lewybody-Erkrankung. T max: 1.5 h HWZ: 6–11 h
Haldol® (Haloperidol) Trpf. 2 mg/ml (1 Tropf = 0.1 mg)	3 – 5 –10 Tropfen 2 x tgl 5–10 Tropfen bei Bedarf zusätzlich alle 4 Stunden ² max. 2–3 mg/Tag	2. Wahl Gut antipsychotisch, verursacht weniger häufig Hypotonien als Quetiapin, weniger sedierend. Cave: extrapyramidale Nebenwirkungen (EPS). Tardive Dyskinesien. Max. Effekt oral nach 4–6 h HWZ: 12–36 h ¹
Dipiperon® 40 mg Tbl. (Pipamperon)	10–20 mg max. 40–80 mg	Sedierendes Neuroleptikum, weniger antipsychotisch, bei höherer Dosierung EPS. Wirkeintritt 2–4 h HWZ: 17–22 h
Risperdal® 0.5 mg Tbl. (Risperidon)	0.25 mg–0.5 mg, max. 2 x/24 h	Gut antipsychotisch, ebenfalls EPS möglich. T max: 1–2 h HWZ: 17–23 h
Temesta expidet® 1 mg Tbl. (Lorazepam)	0.5 mg–1 mg max. 3 mg/24 h	V. a. bei Angst und Entzugsdelirien, sedierende Wirkung. Cave: Atemdepression.
Trittico® 50 mg Tbl. (Trazodon)	25 mg–50 mg	Angstlösend, weniger sedierend.

Nature 2016...

Eine Hoffnung mehr, eine falsche Hoffnung??

**(Von der FDI zugelassen 2021, in Europa abgelehnt
Swissmedic wartet noch zu...)**

The antibody aducanumab reduces A β plaques in Alzheimer's disease

Jeff Sevigny^{1*}, Ping Chiao^{1*}, Thierry Bussière^{1*}, Paul H. Weinreb^{1*}, Leslie Williams¹, Marcel Maier², Robert Dunstan¹, Stephen Salloway³, Tianle Chen¹, Yan Ling¹, John O'Gorman¹, Fang Qian¹, Mahin Arastu¹, Mingwei Li¹, Sowmya Chollate¹, Melanie S. Brennan¹, Omar Quintero-Monzon¹, Robert H. Scannevin¹, H. Moore Arnold¹, Thomas Engber¹, Kenneth Rhodes¹, James Ferrero¹, Yaming Hang¹, Alvydas Mikulskis¹, Jan Grimm², Christoph Hock^{2,4}, Roger M. Nitsch^{2,4}§ & Alfred Sandrock¹§

Aducanumab

ENGAGE and EMERGE: Truth and consequences?

Lewis H. Kuller¹ | Oscar L. Lopez^{2,3}

¹ Department of Epidemiology, Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA

² Department of Neurology, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA

³ Department of Psychiatry, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Correspondence

Dr. Lewis H. Kuller, Department of Epidemiology, University of Pittsburgh, 130 North Bellefield Avenue, Room 354, Pittsburgh, PA 15261, USA.

Email: kullerl@edc.pitt.edu

Abstract

The potential benefit of the anti-amyloid drug aducanumab based on results of recent EMERGE and ENGAGE clinical trials has generated great controversy and has very important implications for the future of anti-amyloid drug therapies. The two trials of 18-month duration were done in patients with mild cognitive impairment (MCI) and early dementia. The ENGAGE trial showed no benefit while the high-dose EMERGE trial initially also showed no benefit but with longer follow-up there was a significant positive benefit. A recent review from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) Advisory Committee was negative while the FDA Office of Neurological Drugs was positive and the statisticians negative. This has generated debate about whether the drug should be approved, disapproved, require a new clinical trial, or approved for a subsample only. The implications for treating both MCI and Alzheimer's disease (AD) patients with anti-amyloid drugs is very substantial as well as the brain amyloid-AD-dementia hypothesis.

Urteilsfähigkeit: wird immer tangiert im Laufe der Erkrankung: äusserst schmerzlich

Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis

2019

2.1. Grundsätzlich wird von Urteilsfähigkeit ausgegangen

Eine Person gilt grundsätzlich als urteilsfähig. Die Urteilsfähigkeit wird nur dann systematisch evaluiert, wenn begründbare Zweifel an dieser aufkommen oder die Feststellung aus juristischen Gründen⁸ erforderlich ist. Die Patientin ist über die Evaluation zu informieren. In der Regel lässt sich weder aus dem Lebensalter noch aus einer bestimmten Diagnose auf Urteilsunfähigkeit schliessen.

Urteilsfähigkeit: es gibt keinen Test, die Diagnostik hilft oft der Ursprung von Konflikten:

1. Informationen verstehen (**Erkenntnisfähigkeit**)
2. Situationen und Konsequenzen, die sich aus alternativen Möglichkeiten ergeben, richtig abwägen (**Wertungsfähigkeit**)
3. Fähigkeit, die erhaltenen Informationen im Kontext eines kohärenten Wertesystems rational gewichten (**Willensbildungsfähigkeit**)
4. Fähigkeit, eigene Wahl zu treffen (**Willensumsetzungsfähigkeit**)

Welche Funktion tangiert am meisten die Urteilsfähigkeit

1. Lernen und Gedächtnis
2. Komplexe Aufmerksamkeit
3. Exekutive Funktionen (Planen, logisches Denken u.a.)
4. Sprache
5. Komplexe motorische Fähigkeit
6. Soziale Kognition

Urteilsfähigkeit und Demenz: Was kann man vorsorgen?

- Patientenverfügung
- Vorsorgeauftrag?
- Vollmacht?
- Testament
- "Exit"?

Wichtig: gute Dokumentation und persönliches Gespräch

- Wenn keine Vorsorge: Meldung an KESB (zuvor Entbindung vom Berufsgeheimnis!)

Vorsorgeauftrag

- Tritt erst in Kraft, wenn jemand nicht mehr urteilsfähig ist
- Bei der Erstellung muss man urteilsfähig sein!
- Validation, wenn man urteilsunfähig ist
- Abgrenzung Vollmacht: diese tritt sofort in Kraft!

Aber Banken akzeptieren sie nicht, wenn sie erst in der Phase der Urteilsunfähigkeit erstellt werden

Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis

Urteilsunfähigkeit ist keine inhärente Eigenschaft, sondern wird dem Patienten zugeschrieben. Diese Zuschreibung beruht auf einem Abwägen relevanter Informationen; sie erfolgt unter Einbezug der moralischen Prinzipien «Respekt vor der Selbstbestimmung des Patienten» und «Fürsorge». Sie gründet somit auf ethisch-normativen Überlegungen, ob dem Patienten die Entscheidungsverantwortung abgenommen werden muss.

Urteilsfähigkeit...

Autonomie vs Fürsorge

- Ärztlich: gleichzeitige Gewichtung zweier ethischer Prinzipien: Respekt vor Selbstbestimmung vs. Gewährleistung von Schutz
- Urteilsfähigkeit kann schwanken (Delir!)
- Mitbestimmung: wie weit ist das möglich?

Betreuung und Behandlung von Menschen mit Demenz

Betreuung und
Behandlung von
Menschen mit Demenz

National Center for Geriatrics and Gerontology
Centro Nacional de Geriatria y Gerontologia
Instituto Nacional de Geriatria y Gerontologia

SAMW/SSM
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Geriatrie und Altersmedizin
Asociación Española de Geriatria y Gerontologia
Societas Geriatrica et Gerontologica Helvetica

Die Urteilsfähigkeit ist immer mit Bezug auf eine konkrete Entscheidung zu beurteilen. Sie kann bei der demenzkranken Person z. B. für einfache Eingriffe und alltägliche Betreuungsmassnahmen, Essenswünsche etc. noch vorhanden sein, wenn sie für komplexere Angelegenheiten und solche von grosser Tragweite (z. B. Abschluss eines Pflegevertrags) bereits fehlt. In jedem Fall ist auch zu überprüfen, ob die getroffene Wahl wirklich freiwillig und ohne äusseren Druck getroffen wurde. Sofern die Urteilsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, muss die demenzkranke Person für den konkreten Entscheid vertreten werden.

Autofahren im Alter Gestern und heute?

Was braucht es zum Autofahren?

1. Lernen und Gedächtnis
2. Komplexe Aufmerksamkeit
3. Exekutive Funktionen (Planen, vorausschauendes Denken u.a.)
4. Sprache
5. Komplexe motorische Fähigkeit
6. Soziale Kognition

Ressourcen: prozedurales Gedächtnis (Fahrfertigkeit!)

Fahreignung bei älteren Menschen

- Erhöhte Unfallgefahr
(pro gefahrener Kilometer)
- Erhöhtes Risiko eines fatalen Unfalles
- > 85 J: Fatale Unfallrate 9x ↑ verglichen mit 25-69 Jährigen
- Erhöhte Unfallgefahr bei Demenzerkrankten
- Mehr Unfälle an Kreuzungen
- Probleme bei Lichtsignalen
- Spurhalten
- Spurwechsel

Claire et al: JAGS 2004; 52: 143-49
Gillepsie et al: Age and Aging 99;28: 53-57
Carr et al: Handbook of Neurology 2019

Auswirkungen der Alzheimerdemenz auf das Autofahren

- Langsamer
- „zu langsam, zu schnell“
- Spurhalten
- Kreuzungen
- Lichtsignale
- Unerwartetes Bremsen
- Aber: nicht alle Demenzerkrankte sind zu Beginn der Erkrankung unsichere Autofahrer

Aber: Eigenregulation

- Weniger Kilometer
- Fahren bei niedriger Risikosituation (gutes Wetter, tagsüber)
- Keine Rushhours
- Fahrten nur in bekannter Umgebung
- Verminderte Geschwindigkeit
- Weniger Überholen
- Weniger Imponiergehabe

Die Ärztinnen und Ärzte im Clinch...

- Konflikt zwischen ärztlicher Beziehung und Verantwortungsbewusstsein
- Wie sage ich es?
- Soll ich etwas sagen?
- Muss ich ein Screening machen????

Revision gesetzliche Mindestanforderungen

Anhang 1 Verkehrszulassungsverordnung (VZV) 2016

Organisch bedingte Hirnleistungsstörungen: Was heisst das, ist Ausschlusskriterium?

"Keine Krankheiten oder organisch bedingte psychische Störungen **mit bedeutsamer Beeinträchtigung** von Bewusstsein, Orientierung, Gedächtnis, Denkvermögen, Reaktionsvermögen oder andere Hirnleistungsstörung.

Keine manische oder erhebliche depressive Symptomatik. Keine verkehrsrelevanten Verhaltensstörungen. Keine Beeinträchtigung von verkehrsrelevanten Leistungsreserven".

Swiss Medical Forum 2017;17(07): 155-160

Revision gesetzliche Mindestanforderungen

Ist das praktikabel?

Anhang 1 Verkehrszulassungsverordnung (VZV) 2016

Bei Demenz ist die «Clinical Dementia RatingScale» (CDR) ein wichtiger Indikator. Anhand des CDR-Score, für den die Einschätzung eines Angehörigen erforderlich ist, kann der Schweregrad der Demenz (von 0 = keine Demenz bis 3 = schwere Demenz) anhand eines strukturierten Fragebogens zu sechs Funktionen (Gedächtnis, Orientierung, Urteilsvermögen, Leben in der Gemeinschaft, Hobbys und Körperpflege) beurteilt werden. Eine leichte Beeinträchtigung (CDR = 0,5) bereitet kaum Probleme, während ein CDR ab 1 ein Risiko für eine ziemlich rasche Verschlechterung der Fahreignung darstellt [5]. **Bei CDR 1 sollte demzufolge insbesondere bei Unfällen und/oder «Parkremplern» beziehungsweise bei Besorgnis eines Angehörigen empfohlen werden, auf das Führen eines Motorfahrzeugs zu verzichten.**

Anhang 1 Verkehrszulassungsverordnung (VZV)

Die Kurzevaluation bestimmter kognitiver Funktionen sollte mittels «Mini Mental State Examination» (MMSE), Uhrentest sowie «Trail Making Test B» (Zahlen-Verbindungs-Test) erfolgen. Bei schweren Beeinträchtigungen in diesen Tests (insbesondere einer MMSE <25 und einem Uhrentest unter 5/7 Punkten) bestehen starke Zweifel an der Fahreignung und es wird eine geriatrische/neuropsychologische Fachuntersuchung empfohlen [3].

Wie sieht das in der hausärztlichen Praxis aus??
MMS <25 ist das schon schwer?

^{1,9}U.P. Mosimann, ²J. Bächli-Biétry, ³J. Boll, ⁴I. Bopp-Kistler, ⁵F. Donati,
⁶R.W. Kressig, ⁷B. Martensson, ⁶A.U. Monsch, ^{8,9}R. Müri, ⁹T. Nef, ¹⁰A. Rothen-
berger, ²R. Seeger, ¹¹A. von Gunten, ¹²U. Wirz

Konsensusempfehlungen zur Beurteilung der medizinischen Mindestanforderungen für Fahreignung bei kognitiver Beeinträchtigung

Consensus Recommendations for the Assessment of Fitness to Drive in
Cognitively Impaired Patients

Tab. 2: Risikoeinschätzung für die Beurteilung der medizinischen Mindestanforderungen bei beginnender Demenz.

	Risikoeinschätzung		
	klein	mittel	hoch
Anamnese			
Polizeikontrollen, Verkehrsbussen, Unfälle (letzte 2 Jahre)		X	
Beifahrer fühlt sich unsicher		X	
Vermeidungsstrategien – Einschränkung Fahrleistung		X	
Clinical Dementia Rating (CDR)			
CDR: 0,5	X		
CDR: 1,0		X	
CDR: >1,0			X
Alltagsaktivitäten			
Leichte Beeinträchtigung IADL		X	
Beeinträchtigung BADL			X
Mini Mentalstatus			
MMSE >24	X		
MMSE 22–24		X	
MMSE ≤21			X
Trail Making B Test			
Testwert <180 s	X		
Testwert >180–200 s		X	
Testwert >300 (d.h. nicht mehr durchführbar)			X
Sehen			
Fernvisus >0,6; Gesichtsfeld >140 Grad; keine Doppelbilder, kein Neglekt	X		
Fernvisus <0,6			X
Gesichtsfeld <140 Grad			X
Doppelbilder			X
Hemispäatialer Neglect			X
HWS-Beweglichkeit			
Kopfdrehen >45 Grad	X		
Kopfdrehen <45 Grad			X
Demenzütiologie und Schweregrad			
Sehr leichte Alzheimer-Demenz (CDR 0,5; MMSE ≥24, Trail B <180)	X		
Leichte Alzheimer-Demenz (CDR 1, MMSE ≥24, Trail B <180)		X	
Frontotemporale Degeneration (Verhaltensvariante)			X
Lewy Körperchen-Demenz (MMSE ≥24, Trail B <180)		X	
Parkinson-Demenz (MMSE ≥24, Trail B <180)		X	
+ zusätzliche demenzassoziierte Komorbiditäten			
Impulsiv, aggressiv (z.B. neuropsychiatrisches Interview)			X
Fehlende Krankheitseinsicht			X
Tagesschläfrigkeit (Epworth Fragebogen ≥12)			X

Demenzütiologie und Schweregrad

	klein	mittel	hoch
Sehr leichte Alzheimer-Demenz (CDR 0,5; MMSE ≥24, Trail B <180)	X		
Leichte Alzheimer-Demenz (CDR 1, MMSE ≥24, Trail B <180)		X	
Frontotemporale Degeneration (Verhaltensvariante)			X
Lewy Körperchen-Demenz (MMSE ≥24, Trail B <180)		X	
Parkinson-Demenz (MMSE ≥24, Trail B <180)		X	

Cave: Anosognosie!!!
Cave: Eigeninteresse der Angehörigen!

Red flags bezüglich Autofahren

- CDR > 1 (mehr als leichte Demenz)
- MMS < 23? (oder schon früher?)
- Pathologische MMS-Figur
- Pathologischer Uhrentest
- Patienten und/oder Angehörige fühlen sich nicht mehr sicher
- Selbständigkeit in mehreren instrumentierten Aktivität beeinträchtigt
- Selbständigkeit in einer basalen Aktivitäten beeinträchtigt
- Keine Krankheitseinsicht
- Aggressives Verhalten

Braucht es nur Tests oder doch mehr?

Anamnese zur Kognition ist sehr wichtig

- Alltagsaktivität (CDR-Stadium, Fremdanamnese, Alltagsfunktionen)
- Fremdanamnese bezüglich Fahrverhalten (Enkelfrage!)
- Auffallendes Fahrverhalten (Fremdanamnese, Polizei)
- Unfälle, Blechschäden vermehrt
- Verminderter Radius
- Selbstgeschildertes Vermeidungsverhalten
- Aggressives, impulsives Verhalten

Die Krux der Polymorbidität: komplex

- Krankheiten: Diabetes mellitus, Herz-Kreislaufkrankung, Schlafapnoe
- Bewusstlosigkeiten, Schwindelattacken, Verwirrheitszustände
Synkopen, Epilepsie, möglicher Sekundenschlaf...
- Sensomotorik: Polyneuropathie, motorische Schwäche u.a.
- HWS: Einschränkung der Beweglichkeit
- Visus: klare Richtlinien, aber bei zusätzlicher Demenz anders werten!
- Polypharmazie, Schlafmedikation!, auch nicht verordnete
Medikamente
- Neue Medikation, Compliance, Adhärenz

Fahreignung und kardiovaskuläre Erkrankungen: gemeinsame Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie und der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin

Genehmigt am 5.5.2019 durch die Qualitätskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie und am 9.5.2019 durch die Sektion Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin

Beispiel Synkope: Oft Ursache nicht klar, besonders in der Geriatrie

Tabella 1: Fahreignung bei Synkopen.

		1. Gruppe	2. Gruppe
Vasovagale Synkope	Einmalige vasovagale Synkope, nicht im Sitzen/ beim Fahren	Fahreignung	Fahreignung
	Rezidivierende vasovagale Synkopen oder einmalige vasovagale Synkope im Sitzen/beim Fahren	Fahreignung, Wartezeit 1 Monat ab letztem Ereignis	Einzelfallbeurteilung, Wartezeit minimal 3 Monate ab letztem Ereignis
Synkope mit auslösenden, beherrschbaren Faktoren (z.B. Schmerz, Anämie, Fieber, Dehydratation)		Fahreignung, sobald auslösender Faktor behoben	Fahreignung, sobald auslösender Faktor behoben
Synkope bei Brady- oder Tachyarrhythmien		Siehe Tabellen 4, 5 und 6	Siehe Tabellen 4, 5 und 6
Unklare Synkope ohne Prodromi, die eine adäquate Schutzreaktion des Patienten erlauben		Fahreignung, Wartezeit 3 Monate ab letztem Ereignis	Nicht fahreignung, bis Diagnose gestellt und Therapie eingeleitet. Bei fehlender Diagnose Wartezeit minimal 12 Monate ab letztem Ereignis

Chapter 31

Driving in the elderly in health and disease

DAVID B. CARR¹, JAMES D. STOWE², AND JOHN C. MORRIS^{3*}

¹*Departments of Medicine and Neurology, Washington University School of Medicine, St Louis, MO, United States*

²*Aging and Adult Services, Mid-America Regional Council, Kansas City, MO, United States*

³*Department of Neurology and Director, Knight Alzheimer Disease Research Center, Washington University School of Medicine, St Louis, MO, United States*

- Es gibt keine Patentlösung
- Allgemeines Screening bezüglich Demenz sinnvoll: keine klare Evidenz
- GPS kann hilfreich sein, muss früh eingesetzt werden
- Kein Test alleine ist aussagekräftig
- Probefahrt kann hilfreich sein: in der Schweiz offizielle Probefahrt nur nach Abklärung durch einen Verkehrsmediziner
- Bei Krankheit aus meiner Sicht nicht durch einen Fahrlehrer überprüfen

Komorbidität und Fahreignung

- Komorbidität ist mindestens so einschränkend wie Kognition
- Kein Dual Tasking während Autofahrt!
- Kein Alkohol
- Richtlinien bezüglich Diabetes sind in Geriatrie oft ein Tabu
- Beachte Richtlinien bezüglich Epilepsie (unterdiagnostiziert)
- Kardiale Richtlinien komplex, zu large bei geriatrischen Patienten?
- Denke an neu verordnete Medikamente!!!!
(Betrifft Fahrfähigkeit, Dokumentation!)

Besteht Fahreignung bei älteren Menschen?

- Ab 85 Jahren grössere Gefahr
- Komorbidität und Alter beachten bei Demenz
- Velo: meist Gefahr der eigenen Person
- E-Bike kann gefährlich sein
- Traktor auf eigenem Terrain auf eigene Gefahr
- Gute Lichtverhältnisse
- Keine Rush Hour
- Möglichst eigenverantwortliche Abgabe
- Komorbidität hervorheben!

**Der Weg ist eine
Gratwanderung...**

**Lieben Dank fürs
Zuhören**